

# OSAKIDETZA

2022ko azaroaren 24ko 1808/2022  
Erabakiaren bidez, egindako Oposaketa-  
Lehiaketarako deia (EHAA 246 Zkia. 2022ko  
abenduaren 27koa)

Concurso-Oposición convocado por  
Resolución nº 1808/2022 de 24 de noviembre  
de 2022 (BOPV Nº 246 de 27 de diciembre de  
2022)

## ERIZAINA ENFERMERA/O

Proba eguna / Fecha prueba  
2023ko urriaren 1ean / 1 de octubre de 2023

### **1. Ariketa / Ejercicio 1** **A Eredua / Modelo A**

## PREGUNTAS

- 1.- **La capacidad del agente para propagarse de un huésped a otro causando enfermedad se denomina:**
- a) Dosis-infectiva.
  - b) Inmunogenicidad.
  - c) Transmisibilidad.
  - d) Patogenicidad.
- 2.- **Con relación a la dinámica de la transmisibilidad y de la enfermedad, señale la respuesta FALSA:**
- a) El periodo de incubación va desde la exposición al agente hasta que comienzan el periodo clínico o sintomático. ✓
  - b) El periodo de latencia consiste en el tiempo desde la infección hasta que la enfermedad se hace transmisible. ✓
  - c) El periodo de contagiosidad transcurre entre la aparición de signos o síntomas similares de la enfermedad entre un caso y el siguiente.
  - d) El periodo de transmisibilidad es el tiempo durante el cual el individuo transmite la enfermedad.
- 3.- **Con relación a los tipos de sistemas de vigilancia de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, señale la respuesta FALSA:**
- a) Según el tipo de dato recogido, existen dos tipos de vigilancia, la basada en pacientes y la basada en resultados de laboratorio. ✓
  - b) Según la amplitud de la recolección de información, existen dos tipos de vigilancia, la de registro de incidencia y de prevalencia.
  - c) Según la destinación de recursos a la recogida de información, existen dos tipos de vigilancia, la activa y la pasiva. ✓
  - d) Según el seguimiento del paciente para la recogida de datos, existen dos tipos de vigilancia, la prospectiva y la retrospectiva.
- 4.- **¿Cuál de las siguientes NO es una fase de la relación de ayuda?**
- a) Acogida.
  - b) Clarificación y definición del problema.
  - c) Entrevista.
  - d) Confrontación y reestructuración del problema.

- 5.- **En relación a los principios generales de las vacunas y la inmunidad, señala la INCORRECTA;**
- a) La inmunidad individual es la protección que obtiene un individuo cuando recibe vacunas que le protegerán frente a las enfermedades hacia las que vayan dirigidas. ✓
  - b) Los toxoides son toxinas bacterianas modificadas, convertidas en no tóxicas, pero con capacidad de estimular la formación de antitoxinas. ✓
  - c) La primovacuna son las dosis iniciales de una vacuna que se necesitan para generar una respuesta inicial adecuada. ✓
  - d) La inmunización pasiva es la inmunidad de grupo que se alcanza con algunas vacunas que pueden proteger a toda la población porque evitan la transmisión del agente infeccioso.
- 6.- **En la prevención de enfermedades infecciosas, ¿en qué nivel de prevención se sitúan las vacunaciones a viajeros?**
- a) Prevención primaria.
  - b) Prevención secundaria.
  - c) Prevención terciaria.
  - d) Prevención cuaternaria.
- 7.- **¿Qué tipo de vacuna es aquella cuyos agentes pierden la virulencia, pero conservan su capacidad replicativa y antigénica para estimular una respuesta inmune?**
- a) Atenuadas (muertas).
  - b) Atenuadas (vivas).
  - c) Inactivadas (muertas).
  - d) Inactivadas (vivas).
- 8.- **Según el modelo de cambio de conducta denominado “la rueda del cambio del comportamiento”, en el centro de la rueda se encuentran tres condiciones fundamentales para el cambio que se relacionan entre ellas y son:**
- a) La capacidad, la seguridad y la oportunidad.
  - b) La capacidad, la motivación y la seguridad.
  - c) La capacidad, la motivación y la oportunidad.
  - d) La motivación, la seguridad y la oportunidad.
- 9.- **La proporción de individuos enfermos en una población en un momento concreto se denomina:**
- a) Incidencia.
  - b) Prevalencia.
  - c) Densidad de incidencia.
  - d) Densidad de prevalencia.



10.- En relación a los parámetros de validez de una prueba diagnóstica, la probabilidad de que un individuo con un test positivo tenga realmente la enfermedad se denomina:

- a) Valor predictivo positivo.
- b) Valor predictivo específico.
- c) Valor predictivo negativo.
- d) Valor predictivo inespecífico.

11.- Respecto a las precauciones de aislamiento, señale la opción **FALSA**:

- a) Las precauciones estándar son aplicadas a todos los/las pacientes atendidos en los hospitales. ✓
- b) El aislamiento de cohortes es especialmente útil durante brotes de enfermedad.
- c) El aislamiento de cohortes supone alojar al paciente en una habitación individual.
- d) Las precauciones basadas en la transmisión se usan para pacientes en los que se conoce o se sospecha la existencia de colonización o infección con patógenos epidemiológicamente importantes y que pueden ser transmitidos por cualquier vía. ✓

12.- Señala a qué concepto se asocia la siguiente definición: Aparición de más casos de los esperados para un período y lugar determinados:

- a) Endemia. *mucho*
- b) Pandemia.
- c) Caso esporádico.
- d) Epidemia.

13.- En cuanto a la cabeza del recién nacido son todas verdaderas EXCEPTO: **FALSO**

- a) Las prominencias frontales, parietales y occipitales deben ser asimétricas.
- b) La fontanela posterior se cierra normalmente a los dos meses de vida.
- c) La fontanela anterior suele cerrarse entre los 12 y los 18 meses.
- d) Los huesos de la cabeza aún no están soldados, lo que permite su amoldamiento, facilitando la salida del feto por el canal del parto.

14.- ¿Cuál de los siguientes enunciados es FALSO?

- a) A partir de los 2 años el menor inicia un proceso de crecimiento más rápido.
- b) El metabolismo basal de niños/as es mayor al de adultos. ✓
- c) El gasto metabólico basal en menores de edad escolar es menor que en la etapa de lactante.
- d) Las necesidades nutritivas de la población en edad escolar dependen de las características individuales, del ritmo de crecimiento, del nivel de maduración y de la actividad física. ✓

**15.- Señale la respuesta correcta sobre la pubertad:**

- a) La pubertad está más relacionada con la edad cronológica que con el grado de maduración.
- b) La ginecomastia en varones debe considerarse como una condición normal durante el desarrollo puberal. *F*
- c) La edad de comienzo de la pubertad es similar en ambos sexos. *F No*
- d) Se considera pubertad precoz la aparición de signos puberales antes de los 10 años en niñas y 12 en niños. *V*

**16.- El test de Silverman-Andersen:**

- a) Contempla tres parámetros. *X S.*
- b) Cada parámetro se valora de 0 a 5 puntos. *X*
- c) Uno de los parámetros que valora es el tiraje intercostal. *V*
- d) Valora la insuficiencia auditiva del neonato.

*Suave  
2019/10/10*

**17.- El recién nacido con crecimiento intrauterino retardado (CIR) o bajo peso:**

- a) Es aquel cuyo peso en el momento de nacer es inferior a 2.000 g, con independencia de la semana de gestación. *X*
- b) Las malas condiciones ambientales pueden ser causa de crecimiento intrauterino retardado.
- c) Se distinguen dos tipos: simétrico y asimétrico.
- d) En el CIR asimétrico el factor causal aparece en el segundo trimestre.

**18.- En lo que a periodos evolutivos de la infancia se refiere es cierto que:**

- a) La edad pediátrica transcurre desde el momento de la concepción hasta los 16-18 años y en ella se diferencian cinco fases. *F*
- b) La etapa del lactante transcurre desde el nacimiento hasta los dos años.
- c) En la etapa preescolar, desde los 2 hasta los 6 años, comienza el desarrollo de la propia autoestima y la estructura de la personalidad.
- d) En el control del niño/de la niña de 13 a 18 años no es necesario realizar una valoración general, somatometría ni desarrollo psicomotor. *F*

*0-2 lact.  
2-6 Pre  
6-12 tsa  
13-18*

**19.- Uno de los factores de alto riesgo prenatal es la macrosomía fetal. ¿Qué puede suponer en el estado de salud de la madre?**

- a) Un mayor riesgo de linfedema.
- b) Un mayor riesgo de diabetes gestacional.
- c) Un mayor riesgo de preeclampsia.
- d) b) y c) son correctas.

20.- **La insuficiencia respiratoria aguda se define como una alteración de las presiones arteriales de oxígeno y dióxido de carbono, indica la respuesta correcta:**

- a) La presión de oxígeno arterial es menor de 60 mmHg y la de dióxido de carbono mayor de 50 mmHg.
- b) La presión de oxígeno arterial es menor de 50 mmHg y la de dióxido de carbono mayor de 60 mmHg.
- c) La presión de oxígeno arterial es menor de 60 mmHg y la de dióxido de carbono menor de 40 mmHg.
- d) La presión de oxígeno arterial es menor de 60 mmHg y la de dióxido de carbono menor de 50 mmHg.

21.- **¿Cuál es una característica del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST (SCASE)? Selecciona la respuesta correcta:**

- a) La isquemia causa daño miocárdico suficiente como para liberar una cantidad detectable de marcadores cardíacos en suero.
- b) El dolor es prolongado y no se alivia ni con reposo ni con nitroglicerina.
- c) En el electrocardiograma es característica la prolongación de la onda Q y la inversión de la onda T.
- d) Las respuestas a) y c) son correctas.

22.- **Según la New York Heart Association, las características de la insuficiencia cardíaca tipo III son las siguientes. Selecciona la respuesta correcta:**

- a) Paciente incapaz de realizar cualquier actividad física sin malestar.
- b) Paciente cómodo/a en reposo, pero la actividad menor que ordinaria causa cansancio, palpitaciones o disnea.
- c) Aparecen síntomas de insuficiencia cardíaca en reposo.
- d) La actividad física ordinaria causa malestar.

23.- **Selecciona la respuesta correcta sobre el índice tobillo-brazo (ITB):**

- a) Se debe sospechar una esclerosis calcificante cuando el ITB sea mayor o igual a 1,10.
- b) A medida que aumenta el grado de estenosis de la arteria hay un aumento progresivo de la presión sistólica distal del sitio afectado.
- c) El/la paciente debe evitar el uso de tabaco o bebidas con cafeína durante al menos dos horas antes de la prueba.
- d) Los/las pacientes con dolor isquémico en reposo tienen un ITB menor de 0,40.

24.- **Selecciona la respuesta correcta sobre la indicación de cada tipo de apósito en el tratamiento de úlceras en las piernas:**

- a) El alginato de calcio, la hidrofibra y los apósitos hidroconductores se usan para heridas con una cantidad escasa de exudado.
- b) Los apósitos hidroconductores promueven el crecimiento de tejido de granulación y la reepitelización, se adhieren al lecho de la herida y el tejido circundante.
- c) Los apósitos de películas semi-permeables se usan para heridas con una cantidad moderada o alta de exudado debido a sus propiedades hidrófilas.
- d) Los apósitos de espuma son permeables tanto a gases como vapor de agua y están indicados para heridas con exudados moderados, en granulación o cubiertas de esfacelos y úlceras por diabetes.

25.- **¿Cuál NO es correcta con respecto a la enfermedad inflamatoria intestinal?**

- a) Las fístulas y los abscesos perianales son comunes en la enfermedad de Crohn.
- b) La colitis ulcerosa afecta de manera primordial al recto y hemicolon izquierdo. ✓
- c) La hemorragia rectal es rara en la enfermedad de Crohn. ✓
- d) La colitis ulcerosa se caracteriza por lesiones granulomatosas bien delimitadas.

26.- **Los/las pacientes con diabetes pueden sufrir complicaciones de la terapia insulínica. Indica la opción correcta con respecto al origen de la hiperglucemia matutina:**

- a) La disminución de la acción de la insulina consiste en un aumento súbito de la glucosa a partir de las 5 de la mañana. *Somogy*
- b) En el efecto Somogy la glucosa es normal o elevada en el momento de acostarse y se incrementa súbitamente a partir de las 3 de la mañana. *F*
- c) El fenómeno del Alba se refiere a la glucosa en sangre que permanece relativamente normal hasta las 3 de la mañana, cuando la cifra se empieza a incrementar. ✓
- d) Las respuestas b) y c) son correctas.

27.- **¿Qué dispositivo se utiliza para la realización de una prueba somatosensorial al evaluar la función neurológica del pie en personas con diabetes?**

- a) Monofilamento de Semmes-Weinstein o un dispositivo vibratorio.
- b) Dispositivo percutorio.
- c) Monofilamento de Schober-Leyman.
- d) Todas son correctas.



28.- ¿Cuál será la puntuación en la Escala de Coma de Glasgow de una persona que localiza estímulos dolorosos, utiliza de forma inapropiada o desorganizada las palabras y abre los ojos en respuesta al habla?

- a) 9 puntos.
- b) 10 puntos.
- c) 11 puntos.
- d) 12 puntos.

Estimulo wot → L. dbb. 5  
vobal → >hapopada 3  
Abre ojos a la voz 3

29.- ¿A cuál de las siguientes complicaciones corresponde la aparición temprana de dolor profundo, palpitante e implacable en la zona de fractura, que no se alivia con fármacos y se intensifica con la movilización pasiva, en una paciente después de una fractura ósea?

- a) Síndrome compartimental.
- b) Embolia grasa.
- c) Osificación heterotópica.
- d) Embolia pulmonar.

30.- ¿En qué posición se debe colocar al o a la paciente portadora de una tracción cutánea tipo extensión de Buck?

- a) Elevación de la cabecera de la cama y de la bisagra de la rodilla para flexionar las caderas un ángulo de 45°.
- b) Elevación de la cabeza 20-30° para actividades cotidianas y flexión de la rodilla de 20-30°.
- c) Plano sobre la cama con las dos caderas flexionadas 45-90°.
- d) Plano sobre la cama; brazo en suspensión y flexionado.

31.- ¿Qué pruebas se utilizan para distinguir la pérdida conductiva de la neurosensorial cuando se altera la audición?

- a) Prueba de Sticker.
- b) Prueba de Weber.
- c) Prueba de Rinne.
- d) Las respuestas b) y c) son correctas.

32.- ¿Cuál de las siguientes NO se incluye entre las recomendaciones dietéticas a pacientes con insuficiencia renal crónica o enfermedad renal en etapa terminal?

- a) Se prefieren las calorías provenientes de hidratos de carbono y grasas.
- b) Restricción individualizada de potasio.
- c) Restricción de proteínas, la proteína permitida debe ser de alto valor biológico.
- d) El líquido permitido debe ser de 1.000 ml más que el gasto urinario de 24 h del día anterior.



- 33.- ¿Cuál de las siguientes recomendaciones le haría a un/una paciente con enfermedad de Ménière?
- ? a) Beber abundante cantidad de líquidos a diario.  
b) Las bebidas carbonatadas están permitidas, no así el café y el té.  
c) Evitar el paracetamol.  
d) Disminuir la ingesta de proteínas de origen animal.
- 34.- Al evaluar el punto de inserción del catéter periférico, ¿qué grado determinará según la escala de Maddox, si observa eritema, tumefacción en el punto de inserción y cordón venoso palpable, de 5-6 cm por encima del punto de inserción y fiebre?
- a) Grado 1.  
b) Grado 2.  
c) Grado 3.  
d) Grado 4.
- 35.- ¿Qué clase farmacológica dentro de los fármacos antineoplásicos tiene la alopecia como efecto adverso frecuente?
- ? a) Agentes alquilantes.  
b) Inhibidores de la topoisomerasa I.  
c) Antimetabolitos.  
d) Alcaloides vegetales.
- 36.- Selecciona la intervención de enfermería relacionada con la integridad de la piel que NO es correcta en reacciones eritematosas por la radioterapia:
- a) Evitar el uso de jabones, cosméticos o perfumes. ✓  
b) Usar solo agua tibia para lavar el área. ✓  
c) Aplicar ungüento de vitaminas A y D.  
d) Aplicar hielo para aliviar el dolor.
- 37.- ¿En qué fase de shock se encuentra un/una paciente que presenta letargia, frecuencia cardíaca mayor de 150 latidos por minuto, petequias y un gasto urinario menor de 0,5 ml/kg/h?
- a) Fase inicial.  
b) Fase compensatoria.  
c) Fase progresiva.  
d) Fase irreversible.
- Fct  
dipicilina*

- 38.- **En el Código Deontológico de Enfermería están prácticamente incardinados los tres grandes grupos, correspondientes a las distintas obligaciones morales. Señala la opción INCORRECTA:**
- a) La Enfermera/o y la institución.
  - b) La Enfermera/o y el ser humano.
  - c) La Enfermera/o y la sociedad.
  - d) La Enfermera/o y el ejercicio profesional.
- 39.- **El proyecto Infección Quirúrgica Zero (IQZ) incluye tres medidas preventivas obligatorias. Indique cuál NO es una de ellas:**
- a) Adecuación de la profilaxis antibiótica.
  - b) Antisepsia de la piel con solución de clorhexidina alcohólica al 2 %.
  - c) Mantenimiento de la normotermia perioperatoria.
  - d) Eliminación correcta del vello.
- 40.- **Los eventos adversos (EA) son los incidentes de seguridad que alcanzan a los/las pacientes causándoles daño. Señale la definición correcta respecto al tipo de víctima en relación a los efectos adversos:**
- a) Primeras víctimas: los/las pacientes que sufren las consecuencias del EA y sus familiares.
  - b) Segundas víctimas: las organizaciones sanitarias en la que acontece el EA.
  - c) Terceras víctimas: los/las profesionales sanitarios involucrados directa o indirectamente en el EA y que resultan afectados/as desde el punto de vista psicológico y emocional.
  - d) Todas las definiciones son correctas.
- 41.- **Las actuaciones que se prestan a las mujeres en situaciones de violencia de género tienen que estar libres de estereotipos sexistas y pueden afectar a cualquier mujer. Aunque sí es importante identificar situaciones de mayor vulnerabilidad. Indica ¿cuál NO es una de ellas?**
- a) Embarazo.
  - b) Adolescencia.
  - c) Residentes en municipios pequeños.
  - d) Diversidad funcional.

- 42.- **En la investigación cuantitativa, ¿qué tipo de diseño es el que examina comparativamente la exposición a un factor de riesgo en sujetos que presentan una enfermedad de interés y en sujetos libres de ella?**
- a) Casos-control.
  - b) Cohortes.
  - c) Ensayo clínico no aleatorizado.
  - d) Transversal.
- 43.- **Donabedian identificó tres dimensiones de evaluación en la valoración de la calidad asistencial. Señala la respuesta que NO es una de esas dimensiones:**
- a) Eficacia.
  - b) Estructura.
  - c) Proceso.
  - d) Resultados.
- 44.- **La selección de participantes en la investigación cualitativa se basa en:**
- a) La utilización de métodos aleatorios de selección.
  - b) La representatividad de la muestra en relación a la población.
  - c) La aplicación de criterios de selección en base a conocimientos o experiencias determinadas.
  - d) Todas las anteriores.
- 45.- **En un estudio de investigación sobre la eficacia de un nuevo apósito para el tratamiento de úlceras por presión, ¿cuál de los siguientes diseños de investigación es el más apropiado?**
- a) Estudio de caso clínico.
  - b) Ensayo clínico aleatorizado.
  - c) Estudio de cohortes.
  - d) Estudio de correlación.
- 46.- **Señala la respuesta correcta sobre el método de observación en la investigación cualitativa:**
- a) Es un método de análisis de datos.
  - b) Permite seleccionar muestras representativas de la población a estudio.
  - c) Se complementa con las notas de campo.
  - d) Todas las anteriores son correctas.



- 47.- En la estructura PICO utilizada en la formulación de preguntas clínicas, ¿qué representa la letra "P"?
- a) Población.
  - b) Pregunta.
  - c) Problema.
  - d) Propósito.
- 48.- ¿Qué se entiende por "intervalo de confianza" en el contexto de la investigación?
- a) La probabilidad de incluir el valor de la población en un intervalo estimado.
  - b) Una medida que determina la relación entre dos variables en un estudio.
  - c) Una técnica que permite generalizar los resultados de una muestra a una población más amplia.
  - d) El nivel de significancia establecido para poder aceptar o rechazar una hipótesis nula.
- 49.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es una característica de una enfermedad crónica?
- a) Tienen causas múltiples y complejas.
  - b) Pueden presentarse repentinamente y presentar estados agudos. ✓
  - c) La acumulación de factores de riesgo en grupos desfavorecidos aumenta la brecha de los resultados de salud.
  - d) No son la causa más común de mortalidad prematura.
- 50.- Cuando se colocan dispositivos sanitarios para evitar las úlceras por presión que pueden causar estos, se debe tener en cuenta:
- a) Que se debe revisar la piel al menos 1 vez al día bajo los dispositivos sanitarios.
  - b) Que no se puede utilizar apósitos de espuma de poliuretano.
  - c) Que se debe revisar la piel al menos 2 vez al día bajo los dispositivos sanitarios.
  - d) b) y c) son correctas.
- 51.- Según el VII plan de adicciones de Euskadi, del total de las urgencias relacionadas con el uso de sustancias, el 65 % eran hombres, y la sustancia principal por la que acudían a urgencias era:
- a) Cocaína.
  - b) Alcohol.
  - c) Cannabis.
  - d) Hipnóticos y sedantes.

52.- **Los cuidados paliativos van dirigidos a:**

- a) Las personas que presentan enfermedades crónicas. F
- b) Solo a pacientes oncológicos. F
- c) Las personas con enfermedades neurológicas. F
- d) Todas las anteriores son incorrectas.

53.- **¿Cuál es el cuestionario más empleado que valora no solo la intensidad del dolor, sino también su cualidad y sus efectos sobre otras variables sociales y psicológicas?**

- a) CDM.
- b) EVA.
- c) BPI.
- d) DN4.

54.- **¿Cuál de las siguientes intervenciones realizará la enfermería en pacientes con riesgo de suicidio?**

- a) No mirar directamente a los ojos para que no se sienta intimidado.
- b) Reforzar las conductas adaptativas para resolver los problemas.
- c) Reforzar los valores y creencias del paciente.
- d) Mantener un tono de voz calmado y por debajo del suyo.

55.- **La escala OARS se utiliza en geriatría para valorar la:**

- a) La situación psíquica o mental.
- b) La situación física.
- c) La situación biomédica.
- d) La situación social.

56.- **Son escalas para valorar el estado cognitivo, todas EXCEPTO:**

- a) Test del dibujo del reloj (Shulman).
- b) Mini Mental State Examination (Folstein).
- c) Global Deterioration Scale (GDS de Reisberg).
- d) Índice de Katz. F.

57.- **Frases como “esto no es real, no me puede estar pasando a mí” son propias de:**

- a) La fase de negación y aislamiento, que es la segunda de las cinco fases del duelo.
- b) La fase de depresión, que es la cuarta de las cinco fases del duelo.
- c) La primera fase de duelo: ira. ✓
- d) La fase de negación y aislamiento, que es la primera de las cinco fases del duelo.

N I N D Dopt  
esca. ra.  
Negación I. N. D Dopt

**58.- En cuanto a la valoración del dolor:**

- a) Las escalas cuantitativas o de intensidad son siempre analógicas visuales.
- b) El cuestionario McGill Pain Questionnaire (CDM) considera el dolor de manera monodimensional.
- c) La escala analógica visual es una escala fácil de usar y de comprender por parte de los/las pacientes pero presenta una baja sensibilidad. *em*
- d) Los métodos fisiológicos se basan en la observación de la conducta que acompaña a la experiencia dolorosa.

**59.- Entre los diagnósticos de enfermería más frecuentes en trastornos psicóticos se encuentran todos EXCEPTO:**

- a) Déficits actividades recreativas.
- b) Descuido personal. ✓
- c) Deterioro de la interacción social. ✓
- d) Deterioro de la dentición.

**60.- El VII Plan de adicciones de Euskadi:**

- a) Abarca el periodo 2017-2023.
- b) Entre sus principios se encuentran el enfoque de Salud en Todas las políticas y la sostenibilidad.
- c) Contempla la intervención a tres niveles: persona, familia y entorno social.
- d) Se estructura en un único eje, el de la reducción de la oferta.

**61.- ¿Cuál de los siguientes procedimientos NO se emplea para valorar el estado nutricional de la población infantil?**

- a) La talla.
- b) El índice nutricional de Waterlow.
- c) El pliegue tricípital.
- d) La batería de Battelle.

**62.- El signo más temprano de aumento de la presión intracraneal es:**

- a) Diabetes insípida.
- b) Cambio en el nivel de conciencia.
- c) Taquipnea.
- d) Pérdida de reflejos pupilares.

- 63.- **Con respecto a las complicaciones locales del tratamiento intravenoso, ¿cuál de las siguientes se corresponde con la definición de “extravasación”?**
- a) Administración involuntaria de una solución o fármaco no vesicante en el tejido que circunda el vaso.
  - b) Se presenta después de la administración inadvertida de una solución o medicamento vesicante o irritante en el tejido circundante.
  - c) Inflamación de una vena que puede clasificarse como química, mecánica o bacteriana.
  - d) Presencia de un coágulo e inflamación en la vena.
- 64.- **¿Cuál de los siguientes factores es un riesgo de caídas?**
- a) Uso de mayor número de medicamentos.
  - b) Uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos.
  - c) La mala adherencia a los medicamentos.
  - d) Todos son factores de riesgo de caídas.
- 65.- **¿Con qué ámbito relacionarías las siglas SNASP?**
- a) Con los cuidados del paciente con problemas respiratorios.
  - b) Con la seguridad del paciente.
  - c) Con actividades de promoción de la salud.
  - d) Con la atención sanitaria pediátrica.
- 66.- **¿Qué es la saturación en la investigación cualitativa?**
- a) La inclusión de un número elevado de variables que dificulta el análisis.
  - b) La eliminación de datos irrelevantes en el análisis.
  - c) La recopilación de información suficiente hasta no obtener nuevos hallazgos al analizar más casos.
  - d) La comparación de los resultados obtenidos con la literatura científica.
- 67.- **¿Cuál de las siguientes intervenciones debería realizar la enfermería dentro del plan de cuidados para las personas con depresión?**
- a) Manejo del delirio.
  - b) Monitorización nutricional.
  - c) Entrenamiento para controlar los impulsos.
  - d) Desempeño ineficaz del rol.

- 68.- **La respuesta que instituciones y agentes sociales dan a los retos planteados por la discapacidad dependen de la conceptualización que se haga de este término. En cuanto a los modelos explicativos del tratamiento de la discapacidad es cierto que:**
- a) El modelo tradicional es sinónimo de discapacidad de los conocimientos, opiniones, experiencias y prácticas acumuladas en una determinada cultura.
  - b) El modelo médico contempla las causas de discapacidad como problemas sociales y personales que requieren además de atención médica y rehabilitadora, el apoyo para la integración social.
  - c) El modelo de integración consiste en la búsqueda de la adaptación del individuo a las demandas y exigencias de la sociedad mediante el establecimiento de medidas terapéuticas, rehabilitadoras y compensatorias que palien las deficiencias.
  - d) Todas las anteriores son falsas.
- 69.- **Existen diferentes modelos organizativos para la atención del paciente terminal. En la mayoría de los modelos:**
- a) Se identifican 3 niveles (básico, intermedio y avanzado).
  - b) Se identifican 2 niveles (básico y avanzado), realizándose ambos en el ámbito de atención primaria.
  - c) Se identifican 2 niveles (básico y avanzado), realizándose ambos en el ámbito domiciliario y hospitalario.
  - d) Todas las anteriores son falsas.
- 70.- **Según la clasificación NIC (Nursing Interventions Classification), es una actividad recomendada ante un diagnóstico de ansiedad:**
- a) Escucha activa.
  - b) Control de ansiedad.
  - c) Nivel de ansiedad.
  - d) Control del miedo.
- 71.- **En cuanto a los datos de prevalencia de la cronicidad por edad y sexo de la Encuesta de Salud de Euskadi llevada a cabo en 2007 (ESCAV'07) recogidos en la Estrategia para afrontar el reto de la cronicidad en Euskadi 2010, señala la correcta:**
- a) La prevalencia de enfermos crónicos supera el 50 % en los grupos de personas mayores de 45 años.
  - b) La prevalencia de enfermos crónicos es superior en hombres en los grupos de personas mayores de 45 años.
  - c) En los menores de 17 años la prevalencia de enfermos crónicos es inferior al 10 %.
  - d) Ninguna de las anteriores.



72.- **La absorción del hierro de la dieta variará dependiendo de una serie de factores. Señale la FALSA:**

- a) El hierro procedente de los alimentos de origen vegetal se absorbe en mayor proporción que el de origen animal. ✓
- b) Las reservas de hierro corporales regulan la absorción de mineral. Si son altas disminuye, y viceversa.
- c) La absorción intestinal del hierro aumenta en presencia de ácido ascórbico o proteínas tisulares animales. ✓
- d) La absorción intestinal del hierro disminuye con la ingesta de salvado, oxalatos, té y antiácidos.

73.- **Al instilar fármacos para que hagan su efecto sobre los senos etmoidales el/la paciente se colocará en:**

- a) Posición de Proetz.
- b) Posición de Fowler.
- c) Posición de Kraske o Jakknife.
- d) Posición de Morestín.

74.- **La teoría del entorno de Florence Nightingale consta de 5 elementos esenciales. Señale la respuesta correcta.**

- a) Aire puro, luz, higiene, eliminación de aguas residuales, agua potable.
- b) Aire puro, luz, alimentación saludable, higiene, agua potable.
- c) Agua potable, higiene, luz, sueño reparador, aire puro.
- d) Eliminación de aguas residuales, ejercicio físico, higiene, luz, agua potable.

75.- **¿Cuál es la velocidad de perfusión necesaria para administrar un fármaco a un/una paciente de 80 kg a una dosis deseada de 1 mg/kg/h y una concentración de fármaco de 2 mg/ml?**

- a) 80 ml/h.
- b) 160 ml/h.
- c) 40 ml/h.
- d) 20 ml/h.

80kg → 80 mg/h

80 mg/h

**76.- Corresponde a los Diplomados universitarios en Enfermería (señálese la respuesta INCORRECTA):**

- a) La dirección de los cuidados de Enfermería orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud.
- b) La evaluación de los cuidados de Enfermería orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud evaluación.
- c) La prevención de enfermedades y discapacidades.
- d) La aplicación de técnicas y la realización de actividades de carácter ocupacional que tiendan a potenciar o suplir funciones físicas o psíquicas disminuidas o perdidas.

**77.- Los titulares de los centros sanitarios y los servicios de salud podrán formalizar convenios y conciertos con el Instituto de Salud Carlos III, con otros centros de investigación, públicos o privados, y con otras instituciones que tengan interés en la investigación sanitaria, para (señálese la respuesta INCORRECTA):**

- a) El desarrollo de programas de investigación.
- b) La designación de tutores de la investigación.
- c) La dotación de plazas vinculadas, o específicas de investigador, en los establecimientos sanitarios.
- d) El establecimiento de sistemas específicos de formación de investigadores durante el período inmediatamente anterior a la obtención del título de especialista.

**78.- Según dispone la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán aprobar sus respectivas carteras de servicios que incluirán, cuando menos:**

- a) La cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud en su modalidad básica de servicios asistenciales.
- b) La cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud en sus modalidades básica de servicios asistenciales y suplementaria.
- c) La cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud en sus modalidades básica de servicios asistenciales, suplementaria y de servicios accesorios.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

**79.- Según dispone la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, la tarjeta sanitaria individual incluirá los siguientes datos:**

- a) Exclusivamente los datos básicos de identificación del titular de la tarjeta.
- b) Exclusivamente los datos básicos de identificación del titular de la tarjeta y del derecho que le asiste en relación con la prestación farmacéutica.
- c) Los datos básicos de identificación del titular de la tarjeta, del derecho que le asiste en relación con la prestación farmacéutica y del servicio de salud o entidad responsable de la asistencia sanitaria.
- d) Los datos básicos de identificación del titular de la tarjeta, del derecho que le asiste en relación con la prestación farmacéutica, del servicio de salud o entidad responsable de la asistencia sanitaria y del profesional al que está adscrito en atención primaria.

**80.- Para el personal estatutario de los servicios de salud, el período nocturno tendrá la siguiente duración:**

- a) Mínima de siete horas e incluirá necesariamente el período comprendido entre las cero y las cinco horas de cada día natural.
- b) Mínima de ocho horas e incluirá necesariamente el período comprendido entre las cero y las cinco horas de cada día natural.
- c) Mínima de ocho horas e incluirá necesariamente el período comprendido entre las doce y las cinco horas de cada día natural.
- d) Mínima de siete horas e incluirá necesariamente el período comprendido entre las doce y las cinco horas de cada día natural.

**81.- La Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, establece respecto a las áreas de salud que:**

- a) La Comunidad Autónoma del País Vasco se divide territorialmente en áreas de salud de acuerdo con la situación socio-económica de cada demarcación geográfica.
- b) En cada área de salud pueden ponerse en práctica las actuaciones esenciales que requiere la tutela general de la salud pública y exclusivamente la asistencia sanitaria primaria.
- c) En cada área de salud se garantizará una adecuada ordenación de la atención primaria y su coordinación con la atención especializada.
- d) Son correctas la a) y la c).

**82.- Señale que respuesta NO es correcta. Son principios programáticos de organización y funcionamiento del sistema sanitario de Euskadi los siguientes:**

- a) La optimización del marco de cualquier tipo de financiación del catálogo de prestaciones sanitarias que asegure la Comunidad Autónoma de Euskadi.
- b) La orientación prioritaria de los medios y actuaciones a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades.
- c) El desarrollo interno de la organización mediante el principio de separación de los cometidos de regulación y financiación del sistema respecto de la provisión de servicios sanitarios.
- d) La responsabilización y participación de los/las profesionales sanitarios en las decisiones de organización y gestión de los recursos que tengan asignados.

**83.- La función de nombrar y separar a los Directores-Gerentes de las organizaciones de servicios sanitarios del Ente Público «Osakidetza-Servicio vasco de salud» corresponderá a:**

- a) La Dirección General del Ente.
- b) La Presidencia del Ente.
- c) El Consejo de Administración del Ente.
- d) Ninguna de las anteriores.

- 105.- Según el modelo de los estadios del cambio de conducta de Prochaska y DiClemente, cuando la persona inicia el cambio y mantiene la conducta por un tiempo, esa persona se encuentra en la etapa o estadio de:
- a) Contemplación.
  - b) Preparación.
  - c) Acción.
  - d) Mantenimiento.
- 106.- ¿Qué tipo de precauciones se deben utilizar ante un paciente con sarampión?
- a) Precauciones de transmisión aérea.
  - b) Precauciones de transmisión por contacto.
  - c) Precauciones de transmisión por gotas.
  - d) No se necesita ningún tipo de precaución.
- 107.- Entre los diferentes tipos de ictus, ¿cuál de ellos tiene como síntomas principales de presentación la cefalea explosiva y disminución del nivel de consciencia?
- a) Ictus trombótico de arterias grandes.
  - b) Ictus trombótico de arterias perforantes pequeñas.
  - c) Ictus embólico cardiógeno.
  - d) Ictus hemorrágico.
- 108.- Corresponde a la organización central de administración y gestión corporativa del Ente Público «Osakidetza-Servicio vasco de salud», en materia de gestión asistencial (señálese la respuesta INCORRECTA):
- a) Supervisar el cumplimiento de las políticas generales de calidad y realizar auditorías.
  - b) Definir criterios generales y proponer la política de precios correspondiente a la prestación de servicios sanitarios incluida en la cobertura pública.
  - c) Coordinar los recursos y, en su caso, proponer medidas de intervención sobre las listas de espera.
  - d) Promover protocolos de interés general.
- 109.- La medicina que hace posible adaptar la intervención médica a las características individuales de cada persona y, en consecuencia, aplicar intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas en aquellos grupos de pacientes que obtendrán un beneficio de las mismas se denomina:
- a) Medicina preventiva.
  - b) Medicina personalizada de precisión.
  - c) Medicina asistencial individualizada.
  - d) Son correctas la b) y la c).

- 110.- Un estudio realizado por el Institute For Safe Medication Practices (ISMP) muestra que la mayoría de los errores por fármacos asociados a eventos adversos graves, están relacionados con:**
- a) El uso reiterado de fármacos de efectos terapéuticos similares cuya interacción produce una alta tasa de efectos secundarios graves.
  - b) La utilización de incorrecta de insulina y anticoagulantes.
  - c) El uso de fármacos asociados a pacientes crónicos.
  - d) La utilización de un número limitado de fármacos.

